

Diretriz de Utilização de Testes Diagnósticos para **Infecção pelo Vírus Zika em Gestantes**

Resolução Normativa RN nº 407, de 3 de Junho de 2016



PCR para o diagnóstico de infecção pelo vírus Zika

1- Cobertura obrigatória para realização de PCR para vírus Zika em gestantes com quadro sugestivo de infecção pelo vírus Zika até o quinto dia do início dos sintomas.

Pesquisa de anticorpos IgM para o diagnóstico de infecção pelo vírus Zika

1- Cobertura obrigatória de Pesquisa de anticorpos IgM para infecção pelo vírus Zika para:

- a. Gestantes com quadro sugestivo de infecção pelo vírus Zika que realizaram teste de PCR cujo resultado foi negativo, a partir do sexto dia dos sintomas.
- b. Gestantes com quadro sugestivo de infecção pelo vírus Zika cujos sintomas se iniciaram há mais de cinco dias.
- c. Gestantes com quadro sugestivo de infecção pelo vírus Zika cujo resultado da primeira pesquisa de IgM foi negativa.
- d. Gestantes assintomáticas no início do pré-natal e no segundo trimestre de gestação.
- e. Gestantes em que foi detectada a presença de microcefalia fetal ou de calcificações intracranianas em qualquer etapa da gestação.
- f. Recém-nascidos cujas mães tenham apresentado teste diagnóstico (PCR ou pesquisa de anticorpos IgM) com resultado positivo para infecção pelo vírus Zika durante a gestação.
- g. Recém-nascidos com microcefalia e/ou alterações do SNC possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika durante a gestação.

Pesquisa de anticorpos IgG para o diagnóstico de infecção pelo vírus Zika

1- Cobertura obrigatória de Pesquisa de anticorpos IgG para infecção pelo vírus Zika para:

- a. Gestantes ou recém-nascidos que realizaram pesquisa de anticorpos IgM cujo resultado foi positivo.

Fonte: DUT - RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 407, DE 3 DE JUNHO DE 2016 <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzI2MA==>

Para fins de utilização dessa diretriz considera-se quadro sugestivo de infecção pelo vírus Zika:

Pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas:

- Febre
- Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido
- Poliartralgia
- Edema periarticular

Fonte: Ministério da Saúde. <http://combateaedes.saude.gov.br/profissional-e-gestor/orientacoes/397-notificacao-compulsoria-febre-do-virus-zika>. Site visitado em 20/04/2016.

Observações:

1- Uma vez que o conhecimento da infecção pelo vírus Zika ainda está em construção, a partir da disponibilização de novas evidências científicas essa diretriz poderá ser revista a qualquer tempo.

2- Cabe ao médico assistente orientar a gestante quanto à limitação dos testes diagnósticos atualmente disponíveis

Unimed 
Belo Horizonte